

绝密 ★ 考试结束前

全国2019年1月自学考试

## 内科护理学(二) 试题

课程代码:03202

请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

### 选择题部分

注意事项:

1. 答题前,考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。
2. 每小题选出答案后,用2B铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡

一、单项选择题:本大题共15小题,每小题1分,共15分。在每小题列出的备选项中

5. 患者，男性，41岁，发现血压升高5年，间断口服降压药物治疗。近一周连续熬夜工作后，突发剧烈头痛伴视物模糊，急诊以“高血压急症”收入院，该患者快速降压治疗首选
- A. 硝普钠  
B. 氢氯噻嗪  
C. 甘露醇  
D. 乌拉地尔
6. 目前已知最强的胃酸分泌抑制剂是
- A. 抗酸药  
B. H<sub>2</sub>受体拮抗剂  
C. 质子泵抑制剂  
D. 胶体次枸橼酸铋
7. 对于诊断溃疡性结肠炎最有价值的检查项目是
- A. 血液检查  
B. 粪便检查  
C. 结肠镜检查  
D. X线钡剂灌肠检查

8. 患者，男性，60岁，因“慢性肾衰竭”入院。入院后肾功能检查结果为：内生肌酐清除率8ml/min，血肌酐820μmol/L，尿素氮20mmol/L。根据我国慢性肾衰竭分期方法，该患者属于
- A. 肾功能代偿期  
B. 氮质血症期  
C. 肾衰竭期  
D. 尿毒症期
9. 患者，女性，29岁，因“月经量过多伴乏力半年”门诊就诊。查体可见四肢皮肤黏膜散在出血点，血小板计数 $45 \times 10^9/L$ ，初步诊断为“特发性血小板减少性紫癜”，该患者首选的治疗应是
- A. 输注浓缩血小板  
B. 血浆置换  
C. 脾切除  
D. 糖皮质激素治疗

14. 患者，男性，58岁，因“剧烈腹泻、呕吐1天”急诊入院。患者自述1周前曾饮用不洁水，拟诊为“霍乱”，该患者治疗的关键是

- A. 抗菌治疗
- B. 补液治疗
- C. 强心治疗
- D. 抗病毒治疗

15. 脑卒中患者预防脑血管病发生，最重要的环节是控制

- A. 高血压
- B. 心脏病
- C. 糖尿病
- D. 血脂异常

二、多项选择题：本大题共10小题，每小题1分，共10分。在每小题列出的备选项中至少有两项是符合题目要求的，请将其选出，错选、多选或少选均无分。

16. 护士对哮喘患者进行定量雾化吸入器的使用指导中，正确的是

- A. 吸入前摇匀药液
- B. 呼气至不能再呼，将喷嘴放入口中

E. 吸入后快速用力呼气以利药物吸收

17. 肺血栓栓塞症中的“肺梗死三联征”是指

- A. 呼吸困难
- B. 胸痛
- C. 晕厥
- D. 烦躁
- E. 咯血

18. 关于呼吸衰竭氧疗的叙述中，正确的是

- A. 氧疗是抢救呼吸衰竭基本而关键的一环
- B. 急性呼衰吸入中、高浓度氧气

22. 慢性肾衰竭处于氮质血症期的患者，饮食护理措施正确的是
- A. 优质低蛋白饮食
  - B. 热量主要由脂肪提供
  - C. 主食以麦淀粉为主
  - D. 水肿、高血压者应当限盐
  - E. 控制磷的摄入
23. 白血病诱导缓解治疗期间，提示患者已达到完全缓解的标准有
- A. 白血病的症状、体征消失
  - B. 骨髓象基本正常
  - C. 中性粒细胞绝对值  $\geq 1.0 \times 10^9/L$

- E. 红系、巨核系正常
24. 系统性红斑狼疮患者皮肤护理措施正确的是
- A. 避免阳光较强的时间外出
  - B. 宜用强碱性肥皂清洁皮肤
  - C. 最好用冷水洗脸
  - D. 勿用各类化妆品
  - E. 指甲勿修剪过短
25. 护士对脑梗死患者体位摆放的指导，正确的是
- A. 保持肩关节外展
  - B. 保持肘关节伸直
  - C. 保持髋关节外旋
  - D. 保持膝关节伸直
  - E. 足背屈与小腿呈直角

### 非选择题部分

注意事项：

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上，不能答在试题卷上。

三、填空题：本大题共 20 空，每空 1 分，共 20 分。



56. 患者，男性，45岁，主因“乏力、纳差5年，加重伴腹胀3个月”门诊入院。患者5年前无明显诱因出现乏力、纳差。3年前因骨折于当地医院手术治疗，术前体检发现HBsAg(+)，肝功能异常，未做进一步诊断和治疗。近3个月来，自觉疲乏无力明显，食欲减退，伴腹胀。为进一步治疗收入院。既往吸烟20余年，饮酒20余年，父亲死于“肝病”。

查体：T 37°C，R 18次/分，P 78次/分，BP 126/68mmHg，肝病面容，巩膜稍黄染，前胸部可见数颗蜘蛛痣。心肺(-)。腹部膨隆，脐周可见迂曲扩张静脉，腹软、全腹无压痛反跳痛，肝脏肋下未触及，脾脏肋下约3cm，边界清晰无压痛，移动性浊音(+)，双下肢不肿。辅助检查：HBsAg(+)，HBeAg(+)，HBcAb(+);血氨不高;胃镜提示食道静脉轻度曲张。初步诊断为“肝硬化失代偿期”，给予休息、保肝、利尿等治疗。

请写出：

- (1) 该患者发生肝硬化的主要病因;
- (2) 该患者诊断为“肝硬化失代偿期”的主要依据;
- (3) 该患者的饮食护理措施。